

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTENTE

**CIALIS 20 compresse rivestite con film mg
tadalafil**

Leggi tutto attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo.
- Se avete qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altri. Perché potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

In questo foglio:

1. Che CIALIS ea che cosa serve
2. Prima di prendere CIALIS
3. Come prendere CIALIS
4. Possibili effetti indesiderati 5
Come conservare CIALIS
6. Ulteriori informazioni

1. CHE COS'È CIALIS EA CHE COSA SERVE

CIALIS è un trattamento per gli uomini con disfunzione erettile. Questo è quando un uomo non può ottenere o mantenere un'erezione adatto per l'attività sessuale.

CIALIS appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati fosfodiesterasi di tipo 5 inibitori. A seguito di stimolazione sessuale CIALIS aiutando i vasi sanguigni nel pene per rilassarsi, permettendo il flusso di sangue al pene. Il risultato di questo è una migliore funzione erettile. CIALIS non vi aiuterà se non si dispone di disfunzione erettile.

E' importante notare che CIALIS non funziona se non c'è stimolazione sessuale. Tu e il tuo partner avrà bisogno di impegnarsi in preliminari, proprio come si farebbe se si stesse non prendendo un medicinale per la disfunzione erettile.

2. PRIMA DI PRENDERE CIALIS Non

prenda CIALIS

- se è allergico (ipersensibile) al tadalafil o ad uno qualsiasi degli eccipienti di CIALIS.
- se sta assumendo qualsiasi forma di nitrato o donatori di ossido di azoto organici come il nitrito di amile. Si tratta di un gruppo di farmaci ("nitrati") utilizzato nel trattamento dell'angina pectoris ("dolore al torace"). CIALIS ha dimostrato di aumentare gli effetti di questi farmaci. Se sta assumendo qualsiasi forma di nitrato o non siete sicuri informare il medico.
- se ha una malattia cardiaca grave o ha avuto un attacco di cuore recente.
- se ha avuto un ictus recente.
- se si dispone di bassa pressione sanguigna o ipertensione non controllata.
- se avete mai avuto una perdita della vista causata da anteriore non-arteritica neuropatia ottica ischemica (NAION), una condizione descritta come "colpo di occhio".

Faccia attenzione con CIALIS

Essere consapevoli del fatto che l'attività sessuale comporta un potenziale rischio per i pazienti con la malattia cardiaca perché sottopone uno sforzo in più sul tuo cuore. Se si dispone di un problema cardiaco si deve informare il medico. Di seguito sono ragioni per cui CIALIS può anche non essere adatto a lei. Se una di queste la riguarda, ne parli con il medico prima di prendere il medicinale:

- Lei ha l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo), la leucemia (tumore delle cellule del sangue) o qualsiasi deformazione del pene.
- Lei ha un grave problema al fegato.
- Si dispone di un grave problema ai reni

Non è noto se CIALIS sia efficace in pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia pelvica o prostatectomia radicale senza nerve-sparing.

Se si verifica un'improvvisa riduzione o perdita della vista, interrompa l'assunzione di CIALIS e contattare immediatamente il medico.

CIALIS non è destinato ad essere utilizzato da donne o da adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Uso con altri medicinali

Informi il medico se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica, perché potrebbero interagire.

Ciò è particolarmente importante se è in trattamento con nitrati poiché non deve assumere CIALIS se sta assumendo questi medicinali.

Un tipo di medicinale chiamato alfa-bloccante viene talvolta usato per trattare l'ipertensione e ingrossamento della prostata. Informi il medico se è in trattamento per una di queste condizioni o se prendere altri medicinali per curare la pressione alta.

Se sta assumendo farmaci in grado di inibire un enzima chiamato CYP3A4 (per esempio, gli inibitori della proteasi o ketoconazolo per il trattamento dell'infezione da HIV) la frequenza degli effetti collaterali potrebbe aumentare. Non prendere CIALIS con altri farmaci se il medico ti dice che non può. Si consiglia di non utilizzare CIALIS insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

Assunzione di Cialis con cibi e bevande

Si può prendere CIALIS con o senza cibo. Informazioni sugli effetti di alcol è nella sezione 3.

Guida di veicoli e utilizzo

Alcuni uomini che assumevano CIALIS negli studi clinici hanno riportato capogiri. Controllare attentamente come reagisce ai farmaci prima di guidare o utilizzare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di CIALIS:

CIALIS contiene lattosio. Se le è stato detto dal medico che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di assumere questo medicinale.

3. COME PRENDERE CIALIS

Prenda sempre CIALIS seguendo esattamente le istruzioni del medico. Si deve consultare il medico o il farmacista se non si è sicuri.

La dose raccomandata è una compressa da 10 mg prima dell'attività sessuale. Se l'effetto di questa dose è troppo debole il medico può aumentare la dose a 20 mg. Le compresse di CIALIS sono per uso orale. Ingoiare la compressa intera con un po' d'acqua. Si può prendere CIALIS con o senza cibo.

Si può prendere una compressa di CIALIS almeno 30 minuti prima dell'attività sessuale. CIALIS può essere ancora efficace fino a 36 ore dopo l'assunzione della compressa. È importante notare che CIALIS non funziona se non c'è stimolazione sessuale. Tu e il tuo partner avrò bisogno di impegnarsi in preliminari, proprio come si farebbe se si stesse non prendendo un medicinale per la disfunzione erettile.

Bere alcol può influenzare la capacità di avere un'erezione. Bere alcol può ridurre temporaneamente la pressione sanguigna. Se ha preso o ha intenzione di prendere CIALIS, evitare eccessive (livello di alcol nel sangue di 0,08% o superiore) di bere, dal momento che questo può aumentare il rischio di vertigine quando ci si alza.

NON deve prendere CIALIS più di una volta al giorno. CIALIS 10 mg e 20 mg è destinato all'uso prima prevista attività sessuale e non è raccomandato per l'uso quotidiano continuo.

Se prende più CIALIS di quanto deve

Informi il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo prodotto, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Come tutti i medicinali, CIALIS può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Questi effetti sono normalmente da lieve a moderata.

In questo foglio, quando un effetto indesiderato viene descritto come "molto comune" significa che è stato riportato in almeno 1 su 10 pazienti trattati con il farmaco. Quando un effetto indesiderato viene descritto come "comune" significa che è stato riportato in più di 1 per ogni 100 pazienti, ma meno di 1 su 10 pazienti. Quando un effetto indesiderato viene descritto come "non comune", questo significa che è stato riportato in più di 1 paziente ogni 1.000, ma meno di 1 su 100 pazienti. Quando un effetto indesiderato viene descritto come "raro", ciò significa che è stato riportato in più di 1 ogni 10.000 pazienti, ma meno di 1 su 1.000 pazienti. Effetti indesiderati riportati molto comunemente nei pazienti che assumono CIALIS sono stati mal di testa.

Effetti indesiderati riportati comunemente nei pazienti che assumono CIALIS includono mal di schiena, dolori muscolari, rossore al viso, congestione nasale, vertigini e indigestione.

Effetti indesiderati non comuni sono reazioni allergiche tra cui rash, dolore addominale, reflusso, visione offuscata, dolore oculare, aumento della sudorazione, battito cardiaco martellante sensazione, una frequenza cardiaca veloce, l'alta pressione sanguigna, la pressione sanguigna bassa e dolore al petto. In caso di dolore al torace che si verificano durante o dopo l'attività sessuale non si dovrebbe usare nitrati, ma si dovrebbe cercare assistenza medica immediata.

Effetti indesiderati rari nei pazienti che assumono CIALIS includono svenimenti, convulsioni e perdita di memoria che passa, gonfiore delle palpebre, gli occhi rossi, un'improvvisa diminuzione o perdita dell'udito, orticaria e sangue dal naso. In rari casi è possibile che un'erezione prolungata e forse dolorosa può verificarsi dopo l'assunzione di CIALIS. Se si dispone di una tale erezione, che dura ininterrottamente per più di 4 ore, è necessario contattare immediatamente un medico.

infarto e ictus sono stati segnalati raramente in uomini che assumevano CIALIS. La maggior parte, ma non tutti questi uomini avevano conosciuto problemi di cuore prima di assumere questo medicinale. Non è possibile determinare se questi eventi siano direttamente correlati a CIALIS.

diminuzione o perdita della vista in uno o entrambi gli occhi parziale, improvvisa, temporanea o permanente sono stati segnalati raramente.

Alcuni ulteriori effetti indesiderati sono stati riportati in uomini che assumevano CIALIS ad una frequenza stimata di rara che non sono stati visti negli studi clinici. Questi includono l'emicrania, gonfiore del viso, reazioni cutanee gravi, alcuni disturbi che colpiscono il flusso di sangue agli occhi, battito cardiaco irregolare, angina e morte cardiaca improvvisa.

Gli effetti sono stati osservati in una sola specie animale che potrebbero indicare compromissione della fertilità. Successivi studi sull'uomo suggeriscono che questo effetto è improbabile negli esseri umani, anche se una diminuzione della concentrazione di spermatozoi è stato visto in alcuni uomini.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE CIALIS

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare CIALIS dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul blister. Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dall'umidità. **Non conservare a temperatura superiore 30 C. medicinali non deve essere gettato nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.**

Chieda al farmacista come eliminare i medicinali richiesti non sono più. Queste misure aiuteranno a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI Cosa

contiene CIALIS

Il principio attivo è tadalafil. Ogni compressa contiene 20 mg di tadalafil. Gli altri componenti sono:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, sodio croscarmellosio, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Che CIALIS e contenuto della confezione

CIALIS 20 mg è in compresse rivestite con film giallo. Essi sono a forma di mandorla e "C 20" impressa su un lato.

CIALIS 20 mg è disponibile in blister contenenti 2, 4, 8, 10 o 12 compresse. Non tutte le confezioni possono

essere commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA, Houten, Paesi Bassi

Produttore: Lilly SA, Avda. de l'Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna Per ulteriori informazioni su questo prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique / België / Belgien

Eli Lilly Benelux SA / NV Tél / Tel: +
32- (0) 2 548 84 84

"???"

"-?.?. ??

. + 359 2 491 41 40

eská republika

? Eli Lilly R, sro Tel: + 420 234
664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A / S Tlf: +45
45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-
(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited. Eesti Tel filiaal: +372
6441100

! # \$: +30 210 629 4600

España

Lilly, SA
Tel: + 34 91 663 5000

Francia

Lilly France SAS Tel. : + 33- (0) 1
55 49 34 34

Irlanda

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited. Tel: + 353-
(0) 1 661 4377

Isola

Icepharma hf. Simi: + 354
540 8000

Italia

Eli Lilly Italia SpA Tel: + 39-
055 42571

! Phadisco Ltd # \$: +357 22
715000

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited p & prima e
vniec * ba Latvij & Tel: +371
67364000

Lietuva

atstovyb Eli Lilly Holdings Limited = Tel. +370
(5) 2649600

Luxembourg / Luxemburg

Eli Lilly Benelux SA / NV Tél / Tel: +
32- (0) 2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft Tel: + 36
1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: +
356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland BV Tel: + 31-
(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge AS Tlf: + 47
22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges.mbH Tel: + 43-
(0) 1 711 780

polska

Eli Lilly Polska Sp. z oo Tel. : +48
(0) 22 440 33 00

Portogallo

Lilly Portogallo Produtos
Farmacêuticos, Lda. Tel: +
351-21-4126600

Romania

Eli Lilly România SRL Tel: + 40
21 4023000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska Družba, doo .
Tel: +386 (0) 1 580 00 10

republika Slovenská

Eli Lilly Slovakia, sro Tel: +
421 220 663 111

Suomi / Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab. Puh / Tel: +
358- (0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: +46
(0) 8 737 88 00

Regno Unito

Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44-
(0) 1256 315000

Questo foglio è stato approvato l'ultima volta Settembre 2010.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA):
<http://www.emea.europa.eu>